



¿Dio positivo para COVID-19?

**Actua
Rápido**

Puede sentirse mejor mas rápido si recibe un tratamiento con anticuerpos. Puede ayudar a mantenerlo fuera del hospital. El tratamiento con anticuerpos funciona mejor si usted es tratado dentro de los primeros días después de haber dado positivo para COVID-19.

Para obtener mas información acerca del tratamiento de anticuerpos siga estos pasos:

➔ **Llame a un proveedor médico de inmediato**

- Llame a su proveedor de atención primaria o de atención urgente.
- Dígales cuándo tuvo los primeros síntomas de COVID-19.
- Dígales si tiene algún otro problema de salud.
- Pregúnteles si pueden ayudarle a obtener tratamiento con anticuerpos monoclonales.

➔ **Obtenga una referencia a una clínica**

Si el tratamiento con anticuerpos es adecuado para usted, el proveedor hará una referencia a una clínica cercana a usted donde usted puede obtener el tratamiento. Le darán la dirección y el número de teléfono de la clínica.

**Muchos planes de salud pueden
pagar el costo total del tratamiento**

**El tratamiento con
anticuerpos funciona contra
la variante delta COVID-19**



www.mAbColorado.org

¿Por qué tengo que ir a una clínica?

- El medicamento se le administra por vía intravenosa.
- El tratamiento necesita entrar en su cuerpo rápidamente.
- Una clínica puede administrarle la vía intravenosa en un lugar seguro y tranquilo.




www.mAbColorado.org


Qué puede esperar cuando vaya a la clínica.




1 Cuando llegue a la clínica, se registrará.




2 Una enfermera le tomará la presión arterial, el ritmo cardíaco y la temperatura.




3 La enfermera pondrá la vía intravenosa en su brazo, o le dará inyecciones debajo de la piel. Usted se sentará en una silla.



4 Si se administra por vía intravenosa, el medicamento tarda 30 minutos en llegar al cuerpo.



5 Después de recibir el medicamento, se quedará una hora para descansar y ser observado.



6 ¡El tratamiento puede ayudarle a sentirse mejor más rápido y mantenerse fuera del hospital!